

Speerstra
Feed Ingredients BV
Postbus 160
8530 AD Lemmer
Tel +31(0)514 569001

ReaShure[®] choline

Pensbestendig choline voor melkvee




ReaShure[®]



www.speerstra.com
mail@speerstra.com

Wat is ReaShure[®] choline?

ReaShure[®] choline is een met plantaardig vet gecoate choline-chloride met minimaal 25% choline. Door de coating is de choline-chloride pensbestendig. Dit in tegenstelling tot de normaal gebruikte choline-chloride, welke voor 98% in de pens wordt afgebroken, en niet beschikbaar is voor het dier op darmniveau.



Opbouw van ReaShure[®]

De kern bestaat uit choline-chloride


Hieromheen, zijn meerdere lagen plantaardig vet aangebracht

Dit vet wordt in de pens niet afgebroken

Wat doet ReaShure[®] choline?

ReaShure[®] choline heeft de volgende positieve invloeden op melkvee:

- Minimalisering vette levers
- Minimalisering slepende melkziekte
- Verbeterde vruchtbaarheid
- Verhoging melkproductie
- Hogere DS opname begin lactatie



Speerstra

Feed Ingredients BV

Postbus 160

8530 AD Lemmer

Tel +31(0)514 569001



ReaShure®




www.speerstra.com

mail@speerstra.com

Wetenschappelijk onderzoek

Het voeren van ReaShure choline draagt bij aan een hogere drogestof opname en melkgift. Dat blijkt uit een overzicht (meta-analyse) van 13 verschillende, onafhankelijke onderzoeken. Choline is essentieel voor de gezondheid van de koe.



Minimalisering vette levers

Een vette lever is niet alleen een probleem bij vette koeien. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de koeien een serieuze leververvetting heeft. Het probleem ontwikkelt zich reeds in de droogstand.

Uit onderzoek van Wageningen in 2010 blijkt dat toevoeging van ReaShure aan het rantsoen van melkkoeien, van 3 weken voor- tot 4 weken na kalven, **de transitieperiode versoepelt en stofwisselingsziekten vermindert** door;

- Hogere DS opname
- Hogere glucose / energie en nutriënt opname
- Lagere lever triglyceriden en NEFA niveaus
- Sneller herstel van vette levers
- Hogere melkeiwit bij start lactatie (+ 136 gram / dier / dag)

Dosering ReaShure

60 gram per koe per dag.

Toepassing ReaShure

Eenvoudig gebruik als topdressing en via mineraalvoer, of in veevoeders. Vanaf 3 weken voorafgaand aan afkalven tot en met 4 weken na afkalven.